

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: Государственное автономное учреждение Чувашской Республики

ФИО: Матвеев Роман Степанович


Должность: Ректор

Дата подписания: 17.01.2023 15:58:55

«Институт усовершенствования врачей»

Уникальный программный ключ: Министерства здравоохранения Чувашской Республики

a1fcfed18b7ed974d9aae7ca022a0bd4130c0e7f8



**Фонд оценочных средств  
для текущего контроля знаний и  
промежуточной аттестации по дисциплине  
Трансфузиология**

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальностям:

**31.08.32 Дерматовенерология**

Квалификация – Врач – дерматовенеролог

**31.08.53 Эндокринология**

Квалификация – Врач – эндокринолог

**31.08.58 Оториноларингология**

Квалификация – Врач – оториноларинголог

Форма обучения - очная

**Паспорт фонда оценочных средств  
по дисциплине  
Трансфузиология**

<b>Оценочные средства</b>	<b>Количество</b>
<b>Текущий контроль знаний</b>	
Тестовые вопросы	156
<b>Промежуточная аттестация</b>	
Вопросы для зачета	23

**Критерии текущего контроля знаний:**

**- Критерии оценивания тестирования**

<b>Оценка</b>	<b>Критерии</b>
<b>«Отлично»</b>	91% и выше правильных ответов тестовых заданий
<b>«Хорошо»</b>	от 81% до 90% правильных ответов тестовых заданий
<b>«Удовлетворительно»</b>	от 71% до 80% правильных ответов тестовых заданий
<b>«Неудовлетворительно»</b>	ниже 70% правильных ответов тестовых заданий

**Критерии промежуточного контроля знаний обучающегося**

**«Зачтено»** - выставляется ординатору, показавшему знание основного учебного материала необходимого для дальнейшей работы, выполнившего задания, предусмотренные программой, может привести примеры, доказывающие базовые теоретические положения изученной дисциплины.

**«Не засчитано»** - выставляется ординатору, показавшему значительные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившего принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

**Перечень тестовых вопросов:**

**1. Вероятными путями сенсибилизации к антигенам системы Резус являются:**

1. беременность резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом
2. переливание неодноименной по резус-фактору крови
3. все перечисленные ответы правильные

Ответ: 3

**2. Появление агглютинации эритроцитов в каплях Цоликлонов анти-А, анти-В, анти-АВ при определении группы крови по системе АВ0 расценивается как принадлежность больного:**

1. к первой группе кровь
2. к четвертой группе крови

Ответ: 2

**3. Для чего предназначена биологическая проба при переливании крови**

1. для выявления несовместимости переливаемой крови по факторам системы АВ0
2. для выявления несовместимости переливаемой крови по факторам системы резус
3. для выявления несовместимости переливаемой крови по факторам, не определяемым *in vitro* в пробах на индивидуальную совместимость
4. все ответы правильные

Ответ: 3

**4. Перед переливанием эритроцитов содержащих сред врач обязан:**

1. правильно выбрать трансфузционную среду
2. перепроверить группу крови больного и донора
3. произвести пробы на индивидуальную совместимость
4. произвести биологическую пробу
5. провести комплекс всех перечисленных мероприятий

Ответ: 5

**5. К возникновению ошибок при определении группы крови приводит:**

1. промывание пипеток водой, а не физраствором хлорида натрия
2. использование для реакции недоброкачественных реагентов
3. неправильное соотношение капель реагентов и исследуемой крови
4. дача преждевременного заключения о группе крови
5. все ответы правильные

Ответ: 5

**6. Какие пробы на совместимость следует производить при переливании свежезамороженной плазмы?**

1. биологическую
2. холодовую

Ответ: 1

**7. К переливанию компонентов крови во время плановой операции может быть привлечен:**

1. врач-хирург
2. врач-анестезиолог
3. врач-трансфузиолог; врач-хирург или анестезиолог, не участвующие в операции
4. любой врач, не принимающий участие в операции

Ответ: 3

**8. Для оценки показаний к назначению гемотрансфузии в общем анализе крови берутся во внимание:**

1. количество эритроцитов, уровень гемоглобина, цветовой показатель, гематокрит, лейкоцитарная формула, уровень тромбоцитов.
2. количество эритроцитов, цветовой показатель, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов.
3. уровень гемоглобина, количество эритроцитов, цветовой показатель, скорость оседания эритроцитов
4. уровень гемоглобина, количество эритроцитов, скорость оседания

Ответ: 1

**9. В каком ответе наиболее точно приведены признаки инфицированной крови**

1. ярко-розовое окрашивание плазмы, наличие плавающих на поверхности плазмы мелких сгустков, жидкая липкая глобулярная масса, отсутствие четкой границы между плазмой и глобулярной массой
2. сливкообразная консистенция крови, пурпурный/черный цвет глобулярной массы, наличие сгустков, цвет плазмы тусклый, с серо-бурым оттенком, она теряет прозрачность, в ней появляются взвешенные частицы в виде хлопьев или пленок.

Ответ: 2

**10. При даче преждевременного заключения о группе крови, не дожидаясь истечения требуемого инструкцией к реагентам времени наблюдения реакции гемагглютинации, можно спутать:**

1. вторую группу с четвертой
2. вторую группу с первой
3. первую группу с четвертой
4. первую группу с третьей
5. вторую группу с третьей

Ответ: 2

**11. Какие из перечисленных агглютининов являются иммунными**

1. бета-агглютинины
2. антирезус-агглютинины
3. альфа-агглютинины
4. все перечисленные агглютинины

Ответ: 2

**12. При понижении в холодильнике температуры ниже +2° С сроки годности эритроцитной массы для переливания:**

1. существенно увеличиваются

2. сокращаются
3. хранение эритроцитной массы не разрешается

Ответ: 3

**13. Признаком групповой несовместимости крови донора и реципиента при переливании является:**

1. нарушение кровообращения в конечности у реципиента
2. развитие у больного посттрансфузионного гемолитического осложнения
3. развитие у больного посттрансфузионной пирогенной реакции

Ответ: 2

**14. Взаимозаменяемы ли определение резус фактора и тщательное проведение пробы с 33% полиглюкином на индивидуальную совместимость**

1. да
2. нет

Ответ: 2

**15 . Перекрестный метод определения группы крови по системе АВО это:**

1. одновременное определение антигенов эритроцитов и естественных антител в сыворотке крови
2. определение с помощью реагентов анти-А и анти-В и дополнительно анти-АВ
3. одновременное определение изогемоагглютининов и групповых веществ в сыворотке

Ответ: 1

**16. При каком дефекте паспортизации контейнер свежезамороженной плазмы использованию для переливания не подлежит**

1. слегка надорвана этикетка
2. не указан идентификационный номер донора
3. не указана на этикетке дата заготовки компонента крови
4. не указана стоимость компонента

Ответ: 3

**17 Что значит правильно определить группу крови по системе АВО**

1. выявить и типировать агглютиногены в эритроцитах
2. установить и типировать агглютинины в сыворотке
3. абсолютно точное заключение можно дать лишь при проведении обоих названных исследований

Ответ: 3

**18. Правильным является утверждение:**

1. Реакция антиген-антитело является однофазной
2. Реакция антиген-антитело имеет фазы взаимодействия и проявления
3. Реакция антиген-антитело имеет три фазы

Ответ: 2

**19. Что может послужить причиной возникновения посттрансфузионного осложнения?**

1. переливание крови, несовместимой по антигенам системы Резус
2. переливание одноименной крови в количестве, на 25% превышающем уровень кровопотери
3. переливание одноименной крови в количестве, не обеспечивающем заместительного эффекта при кровопотере

Ответ: 1

**20. Признаком несовместимости крови донора и реципиента при проведении холодовой пробы на индивидуальную совместимость является**

1. быстрое высыхание капель на тарелке
2. появление агглютинации эритроцитов донора в каплях
3. появление сгустков в каплях

Ответ: 2

**21. При переливании несовместимой в групповом (АВО) отношении крови у пострадавшего развивается посттрансфузионный шок:**

1. бактериальный
2. гемолитический

Ответ: 2

**№22 Пробы на индивидуальную совместимость перед переливанием крови проводятся**

1. между эритроцитами больного и сывороткой донора
2. между эритроцитами донора и сывороткой больного
3. между каплями крови больного и донора

Ответ: 2

**23 . Журнал регистрации трансфузий в больнице предназначен:**

1. для учета получения больным лечебных трансфузионных и инфузионных сред
2. для учета числа больных, получивших переливание; учета количества переливаний и количества перелитых трансфузионных сред; для оценки целесообразности проводимых трансфузий
3. для учета поступления и внутрибольничного расходования трансфузионных сред
4. все ответы правильные

Ответ: 2

**24. Эритроцитная масса применяется:**

1. со стимулирующей целью
2. с заместительной целью
3. с гемостатической целью

Ответ: 2

**25. В плане лечебных мероприятий при острой кровопотере обязательно следует учитывать**

1. обстоятельства, приведшие к возникновению кровотечения; способ и условия транспортировки больного в лечебное учреждение; наличие или отсутствие в лечебном учреждении гемодинамических кровезаменителей
2. время от начала кровотечения до оказания первой медицинской помощи; объем кровопотери

Ответ: 2

**26. В течение какого времени необходимо сохранять гемоконтейнер с остатками крови после гемотрансфузии?**

1. 2 часа при комнатной температуре
2. 24 часа в холодильнике при температуре +2-+6° C
3. 12 часов при комнатной температуре
4. 4 часа в холодильнике +2-+6° C
5. 48 часов в холодильнике +2-+6° C

Ответ: 5

**Следствием групповой несовместимости крови донора и реципиента при переливании крови является:**

1. тромбоэмболия микросгустками
2. развитие посттрансфузионного гемолитического осложнения
3. развитие у больного посттрансфузионной пирогенной реакции

Ответ: 2

**28. При возникновении неприятных ощущений у больного во время проведения биологической пробы при переливании компонента крови следует:**

1. уменьшить скорость введения компонента крови
2. сделать кратковременную остановку, затем продолжить биологическую пробу
3. увеличить скорость введения компонента крови
4. прекратить пробу и отказаться от переливания данной дозы компонента крови

Ответ: 4

**29. Одноименной считается трансфузия эритроцитной массы:**

1. при переливании крови В (III) группы больному AB(IV) группы
2. при переливании крови 0 (I) группы больному А (II) группы
3. оба ответа неправильные

Ответ: 3

**30. Полиглюкин показан для коррекции:**

1. гиповолемии
2. повышения агрегации клеток крови
3. гиперволемии
4. нарушения обмена веществ

Ответ: 1

**31. Холодовая проба на индивидуальную совместимость проводится**

1. при температуре +4° - +6° С
2. при комнатной температуре
3. при температуре +37° С

Ответ: 2

**32. Как следует производить биологическую пробу при переливании полиглюкина**

1. внутривенным введением по 25 мл троекратно струйно с интервалом 3 минуты
2. внутривенным введением 10 кап. затем 30 капель с интервалом 3 минуты
3. внутривенным введением 10 мл, затем 30 мл с интервалом 3 минуты

Ответ: 2

**33. Возможен ли нормальный уровень билирубина при наличии у больного внутрисосудистого гемолиза:**

1. нет
2. да

Ответ: 1

**34. В предварительном перед гемотрансфузией анализе красной крови цветовой показатель оценивается как отношение:**

1. числа эритроцитов к уровню гемоглобина
2. уровня гемоглобина к числу эритроцитов

Ответ: 2

**35. Предтрансфузионный эпикриз должен включать в себя:**

1. показания к переливанию, дозы гемотрансфузионных сред
2. наименование, группу крови, резус принадлежность гемотрансфузионных сред
3. верно: 1 и 2.

Ответ: 3

**36 . При повышении в холодильнике, предназначенном для хранения эритроцитной массы, температуры выше +6° С сроки хранения и годности эритромассы**

1. существенно увеличиваются
2. сокращаются
3. хранение эритромассы не разрешается

Ответ: 3

**37. Появление агрегации эритроцитов в виде монетных столбиков, исчезающих при добавлении физиологического раствора, при определении группы крови по системе АВО считается:**

1. истинной агглютинацией
2. панагглютинацией
3. аутоагглютинацией
4. псевдоагглютинацией

Ответ: 4

**38. Какие посттрансфузионные осложнения относятся к неиммунным осложнениям**

1. гепатит
2. крапивница
3. анафилактический шок

Ответ: 1

**39. Контрольная термометрия больному после переливания крови производится**

1. в течение 6 часов через каждые 3 часа
2. в течение 3 часов ежечасно
3. в течение первых суток после гемотрансфузии через каждые 6 часов

Ответ: 2

**40. Что может послужить причиной посттрансфузионного осложнения**

1. переливание хилезной крови
2. переливание эритроцитной массы без плазмозамещающего раствора
3. переливание крови в количестве, не обеспечивающем заместительного эффекта при кровопотере
4. переливание гемолизированной крови

Ответ: 4

**41. Заражение реципиента инфекционными болезнями возможно при трансфузии:**

1. эритроцитной массы
2. свежезамороженной плазмы
3. кровезаменителей
4. верно 1, 2

Ответ: 4

**42. Что значит правильно определить группу крови по системе АВО**

1. выявить и типировать агглютиногены в эритроцитах при помощи

Цоликлонов

2. выявить и типировать агглютинины в сыворотке при помощи стандартных эритроцитов

3. абсолютно точное заключение можно дать лишь при проведении обоих выше названных исследований

Ответ: 3

**43. Контрольное лабораторное исследование мочи больному после переливания эритроцитной массы следует производить:**

1. на следующий день
2. в день переливания
3. ежедневно в течение одной недели

Ответ: 1

**44. Какие из перечисленных агглютининов по условиям их выявления относятся к холодовым**

1. альфа-агглютинины
2. бета-агглютинины
3. антирезус-агглютинины
4. правильные ответы 1, 2

Ответ: 4

**45. Каково основное физиологическое назначение эритроцитов**

1. осуществление фагоцитоза
2. осуществление белкового питания организма
3. участие в формировании кровяного сгустка
4. перенос тканям кислорода

Ответ: 4

**46. Отсутствие агглютинации в каплях Цоликлонов анти-А, анти-В, анти-АВ при определении группы крови расценивается как принадлежность исследуемой крови:**

1. к четвертой группе
2. к первой группе

Ответ: 2

**47. Следует ли учитывать при переливании криопреципитата группу крови по системе АВО**

- 1. нет
- 2. да

Ответ: 2

**48. Определение резус-фактора Цоликлоном «анти-Д супер» проводится**

- 1. в пробирке с добавлением 33% полиглюкина
- 2. на водяной бане при температуре +37 °
- 3. на плоскости при комнатной температуре

Ответ: 3

**49 Геленпол относится к группе кровезаменителей на основе**

- 1. Желатина.
- 2. Гемоглобина.
- 3. Декстрана.

Ответ: 2

**50. Пригодна ли холодовая проба на индивидуальную совместимость для выявления иммунных антител к антигенам А, В, Резус**

- 1. да
- 2. нет
- 3. пригодна в исключительных случаях при необходимости экстренного переливания крови

Ответ: 2

**51. Среди групповых антигенов крови различают следующие разновидности:**

- 1. Эритроцитарные, лейкоцитарные и тромбоцитарные
- 2. Эритроцитарные, лейкоцитарные и плазменные
- 3. Эритроцитарные, лейкоцитарные, тромбоцитарные и плазменные

Ответ: 3

**52. В течение какого времени необходимо сохранять гемоконтейнер с остатками крови после гемотрансфузии**

- 1. 2 часа при комнатной температуре
- 2. 12 часов при комнатной температуре
- 3. 24 часа в холодильнике
- 4. 48 часов в холодильнике
- 5. 24 часа при комнатной температуре

Ответ: 4

**53. Каково основное назначение лейкоцитов нейтрофильного ряда в организме человека**

- 1. осуществление фагоцитоза
- 2. перенос тканям кислорода
- 3. участие в формировании кровяного сгустка
- 4. продуцирование и перенос гепариноподобных веществ

Ответ: 1

**54. При переливании необходимо выбирать эритроцитную массу одногруппную по системе АВО и одноименную по системе резус во избежание:**

- 1. возникновения у реципиента посттрансфузионной пирогенной реакции
- 2. перегрузки организма больного чужеродным белком
- 3. образования у больного изоиммунных антител
- 4. возникновения посттрансфузионных гемолитических осложнений

Ответ: 4

**55. Универсальным донором считается человек, имеющий группу крови по системе АВО:**

- 1. первую
- 2. четвертую

Ответ: 1

**56 . Как правильно проводится биологическая проба**

1. внутривенно введением по 10 мл крови троекратно струйно с интервалами 3 минуты
2. внутривенно введением по 10 мл крови троекратно медленно капельно с интервалами 3 минуты
3. однократным введением по 50-75 мл крови внутривенно частыми каплями

Ответ: 1

**57. При наличии свежих эритроцитов в моче у больного следует:**

1. воздержаться от гемотрансфузии до выяснения причин гематурии и последующего решения вопроса о целесообразности гемотрансфузии
2. произвести гемотрансфузию, не обращая внимания на анализы
3. отказаться от гемотрансфузии вообще

Ответ: 1

**58. Как правильно ввести больному 10 % раствор хлорида кальция при переливании крови**

1. непосредственно после окончания гемотрансфузии
2. во избежание повторной пункции вены ввести раствор хлорида кальция в ходе трансфузии в ту же систему, по которой переливается кровь

Ответ: 1

**59. Перед переливанием эритроцитсодержащих сред врач обязан:**

1. правильно выбрать трансфузионную среду
2. перепроверить группу крови больного и донора
3. произвести пробы на индивидуальную совместимость
4. произвести биологическую пробу
5. провести комплекс всех перечисленных мероприятий

Ответ: 5

**60. Для выявления неполных иммунных антител, свободно циркулирующих в плазме (сыворотке) больного, применяется:**

1. прямая проба Кумбса
2. непрямая проба Кумбса

Ответ: 2

**61. Какой билирубин накапливается в крови больного с посттрансфузионным гемолитическим осложнением**

1. прямой
2. непрямой
3. оба вида билирубина в равных количествах

Ответ: 2

**62. Нуждается ли реципиент в предварительном проведении проб на индивидуальную совместимость при проведении обменно-замещающего переливания крови**

1. да
2. нет

Ответ: 1

**63. В механизме действия противошоковых кровезаменителей ведущим является:**

1. сгущение эритроцитов
2. выведение избытка жидкости из сосудистого русла
3. увеличение количества белка в крови
4. заполнение сосудистого русла, притягивание жидкости в сосудистое русло, создание и поддерживание в нем высокого коллоидно-онкотического давления

Ответ: 4

**64. В предварительном перед гемотрансфузией анализе мочи для предупреждения возникновения посттрансфузионного осложнения наиболее важное значение имеет:**

1. высокий удельный вес

2. наличие белка
3. большое количество солей в осадке
4. наличие свежих эритроцитов в осадке
5. наличие белка и наличие свежих эритроцитов в осадке

Ответ: 5

**65 . Журнал прихода-расхода трансфузионных сред в больнице предназначен:**

1. для учета проводимых трансфузий в отделениях больницы
2. для регистрации возникших посттрансфузионных реакций
3. для учета правильности поступления и расходования в медицинской

организации трансфузионных сред и составления достоверных отчетных сведений  
Ответ: 3

**66 К возникновению ошибок при определении группы крови по системе АВО приводит**

1. перепутывание и перемешивание реагентов
2. слишком низкая температура в помещении, где проводится исследование
2. наличие биологических особенностей исследуемой крови
3. использование недоброкачественных реагентов
4. все предыдущие ответы правильные

Ответ: 5

**67. Кровь донора и реципиента несовместимы между собой, если:**

1. эритроциты донора агглютинируют сыворотку реципиента
2. сыворотка донора агглютинирует эритроциты реципиента
3. сыворотка реципиента агглютинирует эритроциты донора
4. эритроциты реципиента агглютинируют сыворотку донора
5. все ответы правильные

Ответ: 3

**68. Резус-принадлежность крови больных следует определять:**

1. для предупреждения возникновения резус-сенсибилизации при переливании крови
2. для предупреждения возникновения посттрансфузионного гемолитического осложнения
3. для предупреждения возникновения гемолитической болезни новорожденного
4. для правильного подбора крови при гемотрансфузии
5. все ответы правильные

Ответ: 5

**69. При переливании эритроцитной массы, несовместимой по факторам системы АВО или резус, в сосудистом русле реципиента происходит агглютинация и разрушение:**

1. эритроцитов реципиента
2. эритроцитов переливаемой эритроцитной массы

Ответ: 2

**70. Наиболее чувствительным и рекомендуемым тестом при проведении проб на индивидуальную совместимость является:**

1. реакция агглютинации на плоскости
2. реакция конглютинации с желатином
3. двухэтапная проба в пробирках с антиглобулином
4. непрямая проба Кумбса.

Ответ: 3

**71. Разрушение эритроцитов плода или новорожденного при гемолитической болезни происходит за счет:**

1. аутоиммунных антител ребенка
2. проникновения избыточного количества комплемента через плаценту
3. антител материнского происхождения

Ответ: 3

**72. Для дифференцировки истинной агглютинации и псевдоагглютинации при определении группы крови по системе АВО во все капли, где произошла агрегация эритроцитов, следует добавить**

1. дополнительно по 1-2 капли Цоликлонов
2. по 1-2 капли 5% раствора глюкозы
3. по 1-2 капли дистиллированной воды
4. по 1-2 капли физиологического раствора хлорида натрия

Ответ: 4

**73. Проба на совместимость, выполняемая на плоскости при комнатной температуре, имеет целью выявить у реципиента:**

1. неполные антитела к эритроцитам донора
2. полные антитела к эритроцитам донора

Ответ: 2

**74. При преждевременной даче заключения о группе крови по системе АВО, не дожидаясь истечения установленного инструкцией к реагентам времени, можно спутать**

1. третью группу с четвертой
2. первую группу с третьей
3. вторую группу с четвертой
4. первую группу с четвертой

Ответ: 1

**75. Для транспортировки крови и её компонентов используется:**

1. картонная коробка с ватной обшивкой
2. термоизоляционные сумка, чемодан с наличием в них тепло- или хладоагентов
3. обычный чемодан или хозяйственная сумка

Ответ: 2

**76. Какие из перечисленных агглютининов по условиям их выявления относятся к тепловым**

1. альфа-агглютинины
2. бета-агглютинины
3. антирезус-агглютинины
4. все перечисленные агглютинины

Ответ: 3

**77. После размораживания плазма должна быть использована в течение:**

1. в течение 30 мин.
2. в течение 90 мин.
3. сразу после оттаивания плазмы
4. в течение 60 мин.

Ответ: 4

**78. К биологическим особенностям исследуемой крови относится:**

1. способность эритроцитов давать псевдоагглютинацию или панагглютинацию
2. свойство эритроцитов вступать в агглютинацию лишь в условиях повышенных температур
3. способность эритроцитов вступать в агглютинацию лишь при добавлении больших количеств Цоликлонов

Ответ: 1

**79. Группа крови АВО новорожденных может быть установлена:**

1. только по изогемагглютининам в сыворотке, так как антигены А и В выражены очень слабо
2. только по антигенам эритроцитов, так как изогемагглютинины выражены очень слабо
3. на основании определения групп крови обоих родителей

Ответ: 2

**80. Доноры резус отрицательной группы крови имеют фенотип**

1. dce
2. Cde
3. CdE
4. cdE

Ответ: 1

**81. В каком помещении наиболее целесообразно оборудовать место для временного хранения эритроцитной массы**

1. в операционной
2. в холле общего коридора
3. в материальном складе
4. в буфетном помещении
5. в предоперационной или чистой перевязочной

Ответ: 5

**82. Изоиммунные антитела являются как правило:**

1. полными, холодовыми
2. неполными, требующими особых условий для своего выявления

Ответ: 2

**83 . К растворам гидроксиэтилированного крахмала относятся:**

1. инфукол ГЭК 6% и 10%, НАЕС-СТЕРИЛ 6%, волекам
2. инфукол ГЭК 6% и 10%, волекам, перфторан

Ответ: 1

**84. Правильным является утверждение:**

1. антигенные системы свойственны эритроцитам, лейкоцитам, тромбоцитам и плазменным белкам
2. в антигенные системы объединяют только эритроцитные антигены
3. групповые антигенные системы имеют значение только при гемотрансфузиях
4. в антигенные системы объединяют только лейкоцитарные антигены
5. антигенные системы крови не имеют значения для физиологии человека и инфекционной патологии

Ответ: 1

**85. При переливании крови, несовместимой по факторам системы АВО, у АВО-сенсибилизированного больного развивается:**

1. посттрансфузионная пирогенная реакция
2. посттрансфузионная аллергическая реакция
3. комплекс названных реакций
4. посттрансфузионное гемолитическое осложнение

Ответ: 4

**86. Какие посттрансфузионные осложнения относятся к иммунным осложнениям**

1. бактериальный шок
2. анафилактический шок
3. острые сердечно-сосудистая недостаточность, отёк легких

Ответ: 2

**87. При обнаружении слабого варианта антигена «Du» при определении резус - принадлежности больного результат следует трактовать как:**

1. резус-положительный
2. резус-отрицательный

Ответ: 2

**88. Допустимые режимы хранения свежезамороженной плазмы**

1. 36 месяцев при температуре от - 25° до -30° С
2. 6 месяцев при температуре - 20 ° С
3. 3 месяца при температуре +4° - +6° С

Ответ: 1

**89. Кантилизация плазмы рассматривается как**

1. Дополнительная мера исключения передачи вирусной инфекции
2. Пополнения расходуемых запасов СЗП

Ответ: 1

**90. Показания к аутогемотрансфузии**

1. пациенты с редкой группой крови;
2. уровень гемоглобина ниже 100 г/л
3. гемофилия

Ответ: 1

**91. Кровезаменителями гемодинамического действия являются**

1. полиглюсоль
2. полифер
3. желатиноль
4. дисоль
5. верно: 1,2,3.

Ответ: 5

**92. Регуляторы водно-солевого обмена**

1. стерофондин изотонический
2. реоплиглюкин
3. полиоксидин
4. ацесоль
5. верно 1, 4

Ответ: 5

**93. Антигены - это:**

1. белки
2. различные биохимические структуры, вызывающее иммунный ответ

Ответ: 2

**94. Реакция агглютинации эритроцитов наступает**

1. при склеивании агглютиногенами одноименных агглютининов
2. при склеивании агглютининами одноименных агглютиногенов

Ответ: 2

**95. В схеме свертывания крови гепарин является антикоагулянтом:**

1. непрямого действия
2. прямого действия

Ответ: 2

**96. Реакция гемагглютинации - это:**

1. склеивание эритроцитов при участии фибрин
2. склеивание эритроцитов антителами
3. склеивание эритроцитов тромбоцитами
4. оседание эритроцитов в растворе желатина

Ответ: 2

**97. Реципиенту, имеющему фенотип D+C+c+E-e+ можно перелить эритроциты фенотипа:**

1. D+C-c+E+e+
2. D-C-c+E-e+
3. D-C-c+E+e-

Ответ: 2

**98. "Универсальным опасным" донором считается:**

1. донор AB(IV) группы, имеющий изоиммунные антитела
2. донор O(I) группы, имеющий изоиммунные антитела анти-А или анти-B, или имеющий очень высокий титр естественных антител альфа или бета

Ответ: 2

**99. В предварительном перед гемотрансфузией анализе белой крови наиболее важное значение имеет:**

1. количество лейкоцитов
2. выраженный моноцитоз
3. выраженная эозинофилия
4. наличие большого количества палочкоядерных клеток

Ответ: 3

**100 . В качестве противошоковых применяются кровезаменители:**

1. солевые растворы;
2. осмодиуретики;
3. растворы гидроксиэтилкрахмала;
4. растворы гемоглобина.

Ответ: 3

**101. При переливании крови, несовместимой по факторам системы резус, у резуссенсибилизированного больного развивается:**

1. посттрансфузионная пирогенная реакция
2. посттрансфузионная аллергическая реакция
3. развивается комплекс перечисленных реакций
4. развивается посттрансфузионное гемолитическое осложнение

Ответ: 4

**102. В каком ответе наиболее правильно названы признаки, присущие острому внутрисосудистому гемолизу**

1. резкий подъем АД, учащение пульса, появление крови в моче, нарушение белковообразующей функции печени, увеличение в сыворотке крови количества желчных пигментов
2. выход свободного гемоглобина в жидкую часть крови и в мочу, накапливание свободного непрямого билирубина в крови и тканях, желтушное окрашивание кожи и слизистых

Ответ: 2

**103. В случае необходимости применения трансфузионной терапии сенсибилизированному больному предпочтительно переливание:**

1. цельной крови
2. эритроцитной массы
3. отмытых эритроцитов

Ответ: 3

**104. Вероятность возникновения имунных антител к антигенам системы АВО возникает:**

1. при введении большого количества плазмы одноименной группы
2. при беременности женщины О (I) группы плодом А (II) или В (III )
3. при аутогемотерапии

Ответ: 2

**105. Для выявления антител, фиксированных на эритроцитах, прямой реакцией Кумбса к антиглобулиновой сыворотке добавляют:**

1. отмытые эритроциты больного
2. сыворотку крови больного
3. цельную кровь больного
4. эритроциты в растворе натрия цитрата

Ответ: 1

**106. Для выявления блокирующих антител, фиксированных на эритроцитах больного, применяется:**

1. непрямая проба Кумбса
2. прямая проба Кумбса

Ответ: 2

**107. Групповые антитела крови являются:**

1. альбуминами
2. иммуноглобулинами класса М
3. липопротеинами

4. протеинами

Ответ: 2

**108. По своим свойствам неполные антитела являются:**

1. иммунными, тепловыми класса G
2. естественными, холодовыми класса M

Ответ: 1

**109. Сбор анамнестических данных позволяет:**

1. установить наличие у больного изоиммунных антител
2. установить резус-принадлежность крови
3. прервать начавшуюся посттрансфузионную аллергическую реакцию
4. предположить вероятность изосенсибилизации

Ответ: 4

**110. По системе АВО подгруппы выделяются в следующих группах:**

1. O(I)
2. A(II)
3. AB(IV)
4. верно 2 и 3

Ответ: 4

**111. Основными мерами профилактики гемолитических посттрансфузионных осложнений следует считать:**

1. строгое выполнение техники трансфузии
2. строгое соблюдение методик определения групп крови по системе АВО, системе резус и проведения проб на совместимость.
3. правильное проведение биологической пробы.
4. учет акушерского и трансфузионного анамнеза.
5. верно: 2,3,4

Ответ: 5

**112. Для агглютинации необходимо, чтобы на каждом эритроците фиксировалось следующее количество антител:**

1. несколько десятков
2. несколько сотен
3. не имеет значения
4. несколько тысяч

Ответ: 4

**113. При появлении агглютинации в каплях с Цоликлонами анти-В и анти-АВ группа крови расценивается как:**

1. первая O(I)
2. вторая A(II)
3. третья B(III)
4. четвёртая AB(IV)

Ответ: 3

**114. По системе АВО подгруппы выделяются в следующих группах**

1. O(I)
2. A(II)
3. AB(IV)
4. верно 2,3

Ответ: 4

**115. Для выявления у реципиента полных групповых агглютининов к антигенам донора предназначена**

1. реакция конглютинации с 33% полиглюкином
2. непрямая пробы Кумбса
3. холодовая пробы на индивидуальную совместимость крови по антигенам АВО

Ответ: 3

**116. Отсутствие агглютинации со стандартными эритроцитами группы 0(I) в**

**перекрестной (двойной) реакции при определении группы крови считается:**

1. контролем активности реакции
2. контролем специфичности агглютинации

Ответ: 2

**117. Неполные изоиммунные антитела:**

1. имеют малую величину молекулы Jg G и требуют для своего выявления повышенной температуры и добавления в реакцию коллоида (конглутинина)
2. имеют крупную молекулу Jg M и выявляются реакцией агглютинации в любых температурных условиях

Ответ: 1

**118. Реципиенту, имеющему фенотип D+C+c+E-e+ можно перелить эритроциты фенотипа:**

1. D+C-c+E-e+
2. D+C+c-E-e+
3. D-C-c+E-e-
4. D-C-c+E-e+

Ответ: 4

**119. Жидкие Цоликлоны для определения группы крови АВО следует хранить при температуре**

1. минус 15° С
2. 0° С
3. +2-+6° С
4. +10-+25° С
5. не имеет значения

Ответ: 3

**120. Реакция агглютинации наступает:**

1. при склеивании агглютиногенами одноименных агглютининов
2. при склеивании агглютининами одноименных агглютиногенов

Ответ: 2

**121. При появлении первых признаков цитратной интоксикации необходимо:**

1. уменьшить скорость трансфузии
2. ввести кровезаменитель, содержащий натрий
3. ввести кровезаменитель, содержащий кальций
4. прекратить трансфузию, ввести в/в 10 мл 10% раствора глюконата кальция или 10 мл 10% раствора кальция хлорида

Ответ: 4

**122. Универсальным донором считается человек, имеющий группу крови по системе АВО:**

1. первую
2. четвертую

Ответ: 1

**123. В каком ответе правильно названы температурные условия хранения эритроцитной массы**

1. при комнатной температуре
2. при температуре от +0 до +2 °
3. при температуре от +8° до +12°
4. при температуре от +2° до +6°

Ответ: 4

**124. После размораживания свежезамороженная плазма должна быть использована в течение:**

1. в течение 30 мин.
2. в течение 90 мин.
3. сразу после оттаивания плазмы
4. в течение 60 мин.

Ответ: 4

**125. Уровень гемоглобина в крови у больного, при котором возможна заготовка аутокрови, не должен быть**

1. ниже 120 г/л
2. ниже 100 г/л
3. ниже 110 г/л

Ответ: 3

**126. В каком ответе наиболее правильно названы признаки гемотрансфузионного шока?**

1. общая слабость; снижение температуры тела; неустойчивость АД; острая боль в мышцах нижних конечностей; отсутствие макроскопических изменений при исследовании образца центрифицированной крови больного;

2. общее возбуждение, сменяющееся адинамией; лихорадка; боли в области сердца и в пояснице; в динамике - снижение артериального давления, учащение пульса, появление признаков внутрисосудистого гемолиза и острого нарушения функции почек

Ответ: 2

**127. Для профилактики посттрансфузионных аллергических реакций необходимо:**

1. правильно выбирать трансфузионную среду по группе АВО и резус-фактору
2. тщательно проводить пробы на индивидуальную совместимость
3. проводить десенсибилизирующую подготовку больного в необходимых случаях

Ответ: 3

**128. Какое из перечисленных мероприятий является определяющим в лечении посттрансфузионного гемолитического осложнения**

1. переливание совместимой одноименной крови
2. введение маннитола в дозе 0,5 г на 1 кг массы тела больного
3. обменно-замещающее переливание крови
4. введение щелочных растворов
5. максимально быстрая ликвидация постгемолитической анемии

Ответ: 3

**129. Какое из перечисленных состояний является противопоказанием для применения противошоковых кровезаменителей**

1. сгущение крови
2. стаз эритроцитов в капиллярах
3. продолжающееся внутреннее кровотечение
4. высокий гематокрит

Ответ: 3

**130. В каком ответе наиболее правильно перечислены препараты для парентерального питания**

1. инфезол 40, аминосол, липофундин, глюкоза 20%, интраплипид
2. вамин, неонутрин, волювен, желатиноль, аддамель
3. полиглюкин, липофундин, аминоплазмаль, виталипид
4. реополиглюкин, полибиолин, желатиноль, интраплипид
5. полиглюкин, желатиноль, церулоплазмин, альбумин

Ответ: 1

**131. В каком ответе наиболее правильно названы признаки, присущие острому внутрисосудистому гемолизу**

1. резкий подъем АД, учащение пульса, появление крови в моче, нарушение белковообразующей функции печени, увеличение в сыворотке крови количества желчных пигментов
2. выход свободного гемоглобина в жидкую часть крови и в мочу, накапливание свободного непрямого билирубина в крови и тканях, желтушное

окрашивание кожи и слизистых

Ответ: 2

**132. В каком ответе наиболее правильно перечислены кровезаменители, обладающие противошоковым действием**

1. полиглюкин, аминоплазмаль, интраплазмальный, маннит
2. желатиноль, полиглюкин, аминоплазмаль, вамин, реамберин
3. полиглюкин, желатиноль, реополиглюкин, волекам, полиоксидин

Ответ: 3

**133. Как следует поступить при закупорке иглы в вене при проведении биологической пробы**

1. прочистить иглу мандреном, не выходя из вены
2. создать дополнительное давление в контейнере с трансфузионной средой для освобождения просвета иглы
3. пунктировать другую вену новой иглой

Ответ: 3

**134. Какие из перечисленных структур вызывают сенсибилизацию при попадании в чужой организм**

1. агглютиногены
2. агглютинины

Ответ: 1

**135. Особую важность в посттрансфузионном исследовании мочи имеет:**

1. снижение удельного веса
2. появление белка
3. появление в осадке кристаллов солей мочевой кислоты
4. появление свежих эритроцитов в осадке
5. появление белка и свежих эритроцитов в осадке

Ответ: 5

**136. В каком ответе правильно и полно перечислены компоненты крови**

1. эритроцитная масса, протеин, плазма, лейкоцитная масса
2. эритроцитная масса, лекоцитная масса, тромбоцитная масса
3. эритроцитная масса, тромбоцитная масса, плазма антигемофильная, альбумин
4. эритроцитная масса, плазма, лейкоцитная масса, тромбоцитная масса

Ответ: 4

**137. В каком ответе правильно назван максимальный срок годности эритроцитной массы для переливания, заготовленной на глюцирире**

1. 3 суток
2. 21 сутки
3. должна быть использована в течение первых 2 недель с момента изготовления при условии хранения в холодильнике

Ответ: 2

**138. С чего следует начинать при выведении больного из гемотрансфузионного шока**

1. введение растворов маннитола и соды
2. проведение обменно-замещающего переливания крови
3. переливание одноименной совместимой крови
4. введение сердечно-сосудистых и антигистаминных средств, наркотиков, гормонов и далее - комплекс противошоковых мероприятий

Ответ: 4

**139. Обеспечение безопасности при переливании крови в сочетании с рациональным применением трансфузионных сред включает:**

1. переливание крови и ее компонентов только по строгим показаниям
2. использование препаратов, полученных из плазмы одного донора или малых пуллов плазмы
3. пропаганду аутодонорства, использование методов реинфузии крови

4. верно 1,2,3

Ответ: 4

**140. Вязкость крови состоит в прямой связи с**

1. количеством форменных элементов
2. электрическим потенциалом форменных элементов
3. концентрацией и качественным составом белков плазмы
4. состоянием свертывающей системы
5. все предыдущие ответы правильные

Ответ: 5

**141. В каком ответе наиболее правильно названы цели обменно-замещающего переливания крови**

1. повышение содержания гемоглобина в крови больного
- 2.нейтрализация токсических продуктов в сосудистом русле больного
3. подъем АД
4. эвакуация из сосудистого русла больного токсических продуктов и продуктов гемолиза, возмещение организму утраченного количества крови

Ответ: 4

**142. Что необходимо сделать перед уничтожением трансфузиологических устройств однократного применения**

1. промыть под проточной водой
2. автоклавировать под давлением 2 атм. при температуре 132° С в течение 1 часа.
3. автоклавировать под давлением 1,4 атм.

Ответ: 2

**143. Составление трансфузионной программы для данного больного включает:**

1. определение перечня необходимых трансфузионных сред
2. определение комбинаций трансфузионных сред с другими медикаментами
3. выбор необходимых трансфузионных сред, определение потребного их количества, последовательности применения, скорости и путей введения

Ответ: 3

**144. Противопоказанием для струйного внутривенного переливания эритроцитной массы является:**

1. разжижение крови
2. отсутствие в крови больного VIII фактора (антигемофильный глобулин) свертывающей системы крови
3. стаз эритроцитов в капиллярах
4. острый тромбофлебит

Ответ: 4

**145. В каком ответе наиболее правильно названы особенности системы для внутристенного переливания крови**

1. наличие тройника, шприца и двух зажимов
2. увеличение примерно вдвое по сравнению с системой для обычного внутристенного вливания длины и наличие толстой пунктирующей иглы с мандреном
3. тщательное лигирование системы

Ответ: 2

**146. Какой комплекс тестов говорит о склонности больного к гиперкоагуляции**

1. укорочение времени свертывания крови и длительности кровотечения; увеличение количества тромбоцитов; повышение активности протромбина;
2. удлинение времени свертывания крови; увеличение продолжительности кровотечения; уменьшение количества тромбоцитов; уменьшение содержания фибриногена в плазме

Ответ: 1

**147. Введенный полиглюкин циркулирует в сосудистом русле**

1. 1-2 сут.
2. 3-4 сут.

3. 5-6 сут.
4. 7-8 сут.
5. 9-10 сут.

Ответ: 2

**148. В каком ответе правильно названа последовательность этапов свертывания крови**

1. образование тромбина, образование тромбопластина, выделение тромбоцитарных факторов, образование фибрина, ретракция сгустка и частичный фибринолиз
2. выделение тромбоцитарных факторов, образование тромбопластина, образование тромбина, образование фибринолиза, ретракция сгустка и частичный фибринолиз

Ответ: 2

**149. Иммуноглобулин человека антистафилококковый показан**

1. для лечения стафилококковой инфекции
2. для профилактики инфекционного гепатита
3. для профилактики гриппа
4. для профилактики стафилококкового сепсиса
5. верно 1,4

Ответ: 5

**150. Максимальный срок хранения отмытых эритроцитов**

1. 6 ч
2. 12 ч
3. 18 ч
4. 24 ч
5. 30 ч

Ответ: 4

**151 Основные компоненты криопреципитата**

1. Ф. VIII
2. Ф. I
3. Ф. XIII
4. Ф. II
5. Ф. VII

Ответ: 1

**152. Реинфузия крови противопоказана**

1. при кровотечении в брюшную полость
2. при кровотечении в плевральную полость
3. при кровотечении при оперативных вмешательствах
4. при кровотечении в послеоперационном периоде
5. при выявлении признаков бактериального загрязнения излившейся аутокрови.

Ответ: 5

**153. Следует ли учитывать группу крови по системам АВО и резус при переливании тромбоконцентрата**

1. следует всегда
2. следует лишь при переливании по жизненным показаниям
3. следует лишь при плановом переливании
4. нет необходимости

Ответ: 1

**154. К биологическим особенностям исследуемой крови относится**

1. способность эритроцитов давать агглютинацию при добавлении большого количества Цоликлонов
2. способность эритроцитов давать псевдоагглютинацию или панагглютинацию
3. все предыдущие ответы правильные

Ответ: 2

**155. Укажите правильный пример специфической агглютинации:**

1. между агглютиногеном В и агглютинином бета
2. между агглютиногеном В и агглютинином альфа

3. между агглютиногеном А и агглютинином бета
4. между агглютиногеном В и агглютинином антирезус
5. между агглютиногеном Резус и агглютинином бета

Ответ: 1

**156. Для дифференцировки истинной агглютинации и псевдоагглютинации при определении группы крови во все капли, в которых произошла агрегация эритроцитов, следует добавить:**

1. по 1-2 капли дистилированной воды
2. по 1-2 капли физиологического раствора глюкозы
3. по 1-2 капли физиологического раствора хлорида натрия
4. дополнительно по 1-2 капли Цоликлонов

Ответ: 3

**Вопросы к зачету по дисциплине:**

1. Организация трансфузиологической службы и донорства в России
2. Общие представления об антигенах эритроцитов.
3. Понятие о группе крови.
4. Наследование групп крови АВ0.
5. Способы определения группы крови и резус-фактора.
6. Ошибки при определении группы крови и резус-фактора.
7. Переливание крови и ее компонентов.
8. Механизм действия перелитой крови.
9. Показания к гемотрансфузии.
10. Виды и способы переливания крови.
11. Порядок действия врача при переливании компонентов крови.
12. Компоненты и препараты крови.
13. Цельная кровь.
14. Компоненты крови.
15. Препараты крови.
16. Кровезамещающие растворы.
17. Кровезаменители гемодинамического действия.
18. Дезинтоксикационные растворы.
19. Парентеральное питание.
20. Регуляторы водно-солевого обмена и КЩР.
21. Переносчики кислорода
22. Инфузационные антигипоксанты
23. Посттрансфузионные реакции и осложнения